

RISK FAKTÖRLERİ			Tarih														
1	DUYUSAL (Basınç ya da rahatsız edici durumlar algılama)	Tamamen Kısıtlı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2		Çok Kısıtlı	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3		Hafif Kısıtlı	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4		Bozulma Yok	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	NEMLİLİK (Derideki nemin derecesi)	Sürekli Nemli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
6		Çok nemli	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
7		Ara-sıra nemli	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8		Nadiren nemli	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
9	AKTİVİTE (Fiziksel faaliyet derecesi)	Yatağa bağımlı	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
10		Tek. Sandalyeye bağımlı	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
11		Nadiren Yürüyor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12		Yürümek İçin Yaşı Küçük Olan Hastalar yada yaşına Uygun Sık Yürüyor	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	HAREKET (Pozisyon değiştirme derecesi)	Tamamen hareketsiz	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
14		Çok sınırlı	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
15		Hafif sınırlı	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16		Sınırsız	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
17	BESLENME (Yiyecek alımı)	Çok zayıf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
18		Yetersiz	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
19		Yeterli Besleniyor	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
20		Mükemmel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	SÜRTÜNME VE YIRTILMA	Ciddi Problem	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
22		Problem	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
23		Muhtemel Problem	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
24		Görülen Problem Yok	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
25	DOKU PERFÜZYONU OKSİJENLENME	Son Derece Tehlikeli	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
26		Tehlikeli	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
27		Yeterli	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
28		Mükemmel	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
TOPLAM PUAN																	

RİSK ÖLÇÜMÜ	PUANLAMA	YAPILMASI GEREKEN FAALİYET
Yüksek Risk	23 PUAN ALTI	Her gün bası yarası riski değerlendirilir + gerekli önlemler alınır.

DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN HEMŞİRE (PARAF)

GİRİŞİMLER İşaretleyiniz ( ✓ )

1	Yatağa bağımlı hastalarda 2 saatte bir pozisyon değişiminin sağlanması															
2	Tekerlekli sandalyeye bağımlı hastada saat başı pozisyon değişiminin sağlanması															
3	Yatak başının. 30°'den fazla yükseltilmemesi															
4	Yan yatış pozisyonu verilirken 30°'lik açı ile yan yatışın sağlanması															
5	Bacak aralarının yastıkla desteklenmesi															
6	Topukların yatakla temasının önlenmesi için alt bacak arka kısmına (diz altından ayak bileğine kadar) yastık konulması															
7	Cildin kuru tutulmasının sağlanması															
9	Hastayı yatak başucuna çekerken çarşaf kullanılması															
10	Havali yatak kullanılması															
11	Beslenmenin düzenlenmesi															
Diğer;																