

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ			
<i>Ret Süresi ve Bilgi</i>	<i>Ret Tipi</i>	<i>Ana Kategori</i>	<i>Alt Kategori</i>
3. trimesterde 9 ay	Geçici Ret	Jinekoloji ve Obstetrik	Gebelik Komplikasyonları
1 veya 2. trimesterde ise, 6 ay	Geçici Ret	Jinekoloji ve Obstetrik	Gebelik Komplikasyonları
Tam iyileşme ve tedavinin bitimini takiben en az 3 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyel Bulaş
Bağış öncesi en az 2 saat öncesine kadar tam bir öğün yenmiş olmalıdır. Bağışçı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Bağışçı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski
Sürekli	Kalıcı Ret	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Adrenal Bez Hastalıkları
Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Alkol kullanımı halinde kişinin tam koopere olamayacağı varsayılır ve bağış en az 12 saat ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Psikososyal Durumlar	Kooperasyon Problemleri
Karaciğer fonksiyon testleri düzelene kadar	Geçici Ret: Şartlı	Psikososyal Durumlar	Madde Bağımlılığı
Anafilaksi öyküsü yoksa, cilt allerjisi değilse, kabul edilebilir.	Geçici Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Cildin Allerjik Hastalıkları
Anafilaksi öyküsü veren bağışçılardan kan alımı kabul edilmez	Kalıcı Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Cildin Allerjik Hastalıkları
Tam şifayı takiben 1 gün sonra alınabilir. Cilt alerjilerinde lokal duyarlılık söz konusu değilse ve flebotomi sahasında değilse, kan bağışı için sakınca yoktur. Antihistaminik ilaç enjeksiyonunda 1 gün beklenir.	Geçici Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Cildin Allerjik Hastalıkları
Sürekli	Kalıcı Ret	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ			
<i>Ret Süresi ve Bilgi</i>	<i>Ret Tipi</i>	<i>Ana Kategori</i>	<i>Alt Kategori</i>
Sürekli	Kalıcı Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	Aşırı Duyarlık Reaksiyonları
Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Tanı konulana kadar beklenmelidir. Daha sonra tanıya göre karar verilir.	Geçici Ret: Şartlı	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Tetkik ve İnceleme
Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Isırık flebotomi sahasında değilse, 1 gün	Geçici Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Böcek Isırmaları
Isırık flebotomi sahasında ise, iyileşme beklenir.	Geçici Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Böcek Isırmaları
1 gün	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar
1 gün	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar
Komplikasyon yok ise ve ilaç kullanımı olsun ya da olmasın kabul edilebilir sınırlardaysa kan bağışı kabul edilebilir	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
1 gün	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar
1 gün	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
<i>Ret Nedeni</i>	<i>Ret Süresi ve Bilgi</i>	<i>Ret Tipi</i>	<i>Ana Kategori</i>	<i>Alt Kategori</i>
Arteriyal tromboz	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Asbestozis	Sürekli	Kalıcı Ret	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları
Astım	Oral kortikosteroid kullanımı varsa, son dozu takiben 7 gün	Geçici Ret	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları
Astım	Semptomatikse ve/veya astım krizi emosyonel stresle ilgili ise uygun süre reddedilir	Geçici Ret	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları
Aşılar: BCG (atenue bakteri ve atenue virus aşılıarı)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: canlı attenue kolera aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşılıarı)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: canlı attenue tifo aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşılıarı)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Difteri aşısı (toxoid aşılar)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: enjektabl poliomyelit aşısı (inaktif virüs aşılıarı)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Hepatit B aşısı	1 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: İnfluenza aşısı (inaktif virüs aşılıarı)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Kabakulak aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşılıarı)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: kapsüler polisakkarit tifo aşısı (ölü bakteri aşılıarı)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Aşılar: kene ensefaliti aşısı	Temas varsa, 12 ay	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Kızamık aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşıları)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Kızamıkçık aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşıları)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Koler a aşısı (ölü bakteri aşıları)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Kuduz aşısı	Temas varsa, 12 ay	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Oral poliomyelit aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşıları)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Sarıhumma aşısı (atenue bakteri ve atenue virus aşıları)	4 hafta	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Tetanoz aşısı (toxoid aşılar)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşılar: Tifo aşısı (ölü bakteri aşıları)	Kişi iyi ise kabul edilir	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Aşırı yorgunluk	Bağışçı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Bağışçı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski
Babesiyoz	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyonlar
Bağış aralığının uygunsuzluğu (erkek)	Son bağıştan sonra erkeklerde en az 90 gün geçmiş olmalıdır	Geçici Ret	Temel Kriterler	Bağış Sıklığı
Bağış aralığının uygunsuzluğu (kadın)	Son bağıştan sonra en az 120 gün geçmiş olmalıdır.	Geçici Ret	Temel Kriterler	Bağış Sıklığı

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Bağışçının sorgulama ve/veya bilgilendirme formunu imzalamamış olması	Bağışçı imzalayana kadar reddedilir	Geçici Ret	Temel Kriterler	İdari Nedenler
Baş ağrısı	Altta yatan nedene göre hareket edilir. İyileştikten en az 1 gün sonra.	Geçici Ret	Nörolojik Hastalıklar	Majör Nörolojik Semptomlar
Baş dönmesi	Altta yatan nedene göre hareket edilir. İyileştikten en az 1 gün sonra.	Geçici Ret	Nörolojik Hastalıklar	Majör Nörolojik Semptomlar
Batı Nil virüsü	Tanı konmuş veya şüphelenilmiş ise 4 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Batı Nil virüsü	Hastalığın insanlara bulaşının söz konusu olduğu bir bölgeden ayrıldıktan sonraki 28 gün boyunca reddedilir.	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Bayılma, senkop	Sık ve tekrarlayıcı bayımlarda altta yatan neden belirlenene kadar ret	Geçici Ret: Şartlı	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Beşinci hastalık: çocukluk çağı viral enfeksiyonlar	Etkenle karşılaştıktan sonra en az 21 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Böbrek ve mesane taşları	Asemptomatik ve enfeksiyonsuz olana kadar ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Nefrolojik Hastalıklar	Üriner Taşlar
Böbrek, kalp, karaciğer ve her türlü kadavra kaynaklı doku ve organ nakli	Sürekli	Kalıcı Ret	Transplantasyon	Transplantasyon
Böcek ısırması	Isırık flebotomi sahasında değil ise 1 gün (hekim tarafından herhangi bir bulaş olasılığı ayrıca değerlendirilmelidir).	Geçici Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Böcek Isırmaları
Böcek ısırması	Isırık flebotomi sahasında ise, iyileşme beklenir. Hekim tarafından herhangi bir bulaş olasılığı ayrıca değerlendirilmelidir.	Geçici Ret	Dermatolojik Hastalıklar	Böcek Isırmaları
Bronşit	Ciddi kronik bronşit belirtileri taşıyan kişiler kan bağışı yapamazlar	Kalıcı Ret	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Bruselloz	Tam iyileşmeyi takiben en az 2 yıl	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Bulantı	Herhangi bir hastalığın göstergesi değilse, 1 gün.	Geçici Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Majör GIS Semptomları
Bulantı	Diare ile birlikte ise, tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben en az 3 gün beklenir	Geçici Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Majör GIS Semptomları
Burun kanaması	Altta yatan neden kanama diyatezi ise, tanı konulana kadar beklenir ve tanıya göre hareket edilir.	Geçici Ret: Şartlı	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Kanama Diyatezi
Cerrahi işlemler: minör veya majör cerrahi (ameliyat)	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Chagas hastalığı	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyonlar
Chagas hastalığı	Chagas hastalığının endemik olduğu bölgelerde doğmuş veya transfüzyon yapılmış kişiler, Trypanosoma Cruzi için valide edilmiş bir test sonucunda negatif bulunmuşlarsa, sadece plazmafraksinyasyon amaçlı plazma bağışında bulunabilirler.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyonlar
Chron hastalığı (regional enterit)	Sürekli	Kalıcı Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Kronik İnflamatuvar Hastalıklar
Cilt enfeksiyonları	Sekonder enfeksiyon varsa veya flebotomi alanında enfeksiyon varsa veya yaygın pürülan yaralar varsa uygun süre reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	Dermatolojik Hastalıklar	Cilt Enfeksiyonları
Cinsel ilişki: AIDS hastalarının cinsel partnerleri	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: diyalize giren bir kişi ile cinsel ilişki	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: erkek erkeğe cinsel ilişki	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Cinsel ilişki: hemofili hastası bir kişi ile cinsel ilişki	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: HIV I-II taşıyıcılığı olan kişilerin cinsel partnerleri	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: HIV yönünden riskli bölgelerde 6 aydan kısa yaşamış ancak bu ülkelerin vatandaşları ile cinsel teması olmuş kişiler	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: kan ve kan ürünü alan bir kişi ile cinsel ilişki	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: para karşılığında cinsel ilişki	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Cinsel ilişki: uyuşturucu karşılığında cinsel ilişki	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Creutzfeldt Jacob hastalığı – CJD	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Prion Hastalığı
CJD: 01.01.1980-31.12.1996 tarihleri arasında toplam olarak 6 ay veya daha uzun süre Birleşik Krallıkta (İngiltere, K.İrlanda, Galler, İskoçya) yaşamış kişiler	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Prion Bulaş Riski
Delici takılar	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Demans	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Serebrumun Yaygın Hastalıkları
Diabetes insipidus	Sürekli	Kalıcı Ret	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Hipofiz Hastalıkları

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Diabetes mellitus	İnsulin kullanımı varsa veya komplikasyon gelişmişse, kalıcı olarak ret edilir.	Kalıcı Ret	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Karbohidrat Metabolizması Hastalıkları
Diyare	Tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben en az 3 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Direkt Coombs testi (direkt antiglobulin testi) pozitifliği	İlk kez direct antiglobulin testi pozitifliği bulunması halinde 1 yıl geçici ret verilir.	Geçici Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Direkt Coombs testi (direkt antiglobulin testi) pozitifliği	Direkt Coombs testinin en az 1 yıl arayla tekrarlayan pozitifliği halinde kalıcı olarak ret verilir	Kalıcı Ret	İmmunoloji ve Allerjik Hastalıklar	İmmünizasyon
Diş tedavisi: ruhsatlı yerde yapılan diş çekimi veya kanal tedavisi gibi kanamalı müdahaleler	7 gün	Geçici Ret	Ağız Ve Diş Hastalıkları	Diş Hastalıkları
Diş tedavisi: ruhsatlı yerde yapılan dolgu veya diş taşı temizliği gibi kanamasız müdahaleler	1 gün	Geçici Ret	Ağız Ve Diş Hastalıkları	Diş Hastalıkları
Diş tedavisi: ruhsatsız yerde yapılan diş tedavisi	12 ay	Geçici Ret	Ağız Ve Diş Hastalıkları	Diş Hastalıkları
Dövme	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Duramater grefti	Sürekli	Kalıcı Ret	Transplantasyon	Transplantasyon
Emboli (serebral emboli hariç)	Sebeplerin derin ven trombozu ya da pulmoner emboli ise, sadece 1 kez olmuşsa ve asemptomatikse, antikoagülan tedavinin üstünden 1 ay sonrasında kadar ertelenir	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Emboli: serebral emboli	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Serebral Damar Hastalıkları
Emosyonel stres kaynağı	Bağışçısı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Bağışçısı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski
Endoskopik muayene	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Enfeksiyon: bilinmeyen	Nedeni bilinmeyen bir enfeksiyonun varlığında veya şüphe edildiğinde ret süresi hekim tarafından değerlendirilir.	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Majör Enfeksiyon Semptomları
Epilepsi	İlaçla tedavi gerektirmeyene ve son 3 yılda konvülsiyon/nöbet geçirilmeyene kadar ret	Geçici Ret	Nörolojik Hastalıklar	Nöbetle Seyreden Hastalıklar
Esrar kullanımı: risk gruplarına dahil değil ancak esrarın etkisinde ise	Uygun süre	Geçici Ret	Psikososyal Durumlar	Kooperasyon Problemleri
Esrar Kullanımı: risk gruplarına dahil ise	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Flebit	Son 12 ay içinde başka flebit görülmemişse, tedavi ve semptomların bitimini takiben en az 7 gün sonra kan bağıışı alınabilir	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Flebotomi sahasında herhangi bir lezyon	Tam iyileşme sağlanana kadar	Geçici Ret: Şartlı	Dermatolojik Hastalıklar	Cildin Allerjik Hastalıkları
Fobiler	Özellikle kan görme fobisi veya iğne fobisi gibi durumlarda tedavi olana kadar beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Psikososyal Durumlar	Fobiler
Fungal enfeksiyon: sistemikse veya derin dokular tutulmuşsa	Tam iyileşmeden sonra en az 1 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Fungal Enfeksiyon
Gastrektomi	Sürekli	Kalıcı Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Cerrahi Uygulamalar
Gastrit	Tam iyileşme sağlanana ve tedavi tamamlanana ve semptomlar kaybolana kadar ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Mide-Duodenum Hastalıkları
Gebelik	Gebelik boyunca ve doğumdan sonra en az 9 ay ertelenir.	Geçici Ret	Jinekoloji ve Obstetrik	Fizyolojik Durumlar
Genital siğiller	Tam iyileşme ve tedaviden sonra en az 12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Gingivitis	Semptomsuz olana kadar beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Ağız Ve Diş Hastalıkları	Periodontal Hastalıklar
Glikoz 6 Fosfat Dehidrojenaz eksikliği	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Glomerülonefrit, akut	Tam olarak iyileşmeden 5 yıl sonrasına kadar ertelenir	Geçici Ret	Nefrolojik Hastalıklar	Glomerüler Hastalıklar
Gonore	Tam iyileşme ve tedaviden sonra en az 12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Göğüs ağrısı	Bir doktor tarafından değerlendirilmişse ve kalp hastalığına bağlı değilse kabul edilir	Geçici Ret: Şartlı	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları
Graves hastalığı	Tiroid fonksiyonları normal ve troid ilaçları kullanmıyorsa, kan bağıışı kabul edilir.	Geçici Ret: Şartlı	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Troid Hastalıkları
Grip benzeri ateşli tablo	Semptomların bitiminden sonra en az 2 hafta	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Guillain Barre sendromu	Tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben en az 2 yıl	Geçici Ret	Nörolojik Hastalıklar	Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları
Gut	Akut gut atağı söz konusu ise, semptomlar yatışıncaya kadar reddedilir. Hastalık kontrol altındaysa, uygun ilaç kullanıyorsa, kan bağıışı kabul edilebilir. kolşisin kullanımı tek başına engel değildir.	Geçici Ret	Kas İskelet Sistemi ve Bağ Doku Hastalıkları	Artritler
Hacamat	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hapis, tutukluluk, gözaltı: 3 günden uzun süre ise,	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hashimato tiroiditi	Akut dönem boyunca reddedilir.	Geçici Ret: Şartlı	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Troid Hastalıkları
Hayvan ısırıkları: evcil olmayan bir hayvan tarafından ısırılma	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Hayvan ısırıkları: evcil ve kuduz şüphesi	İyileşene kadar beklenir	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hayvan ısırıkları: ısırık yerinin iyileşmemiş olması (hayvan ısırıkları ile ilgili diğer durumlar dikkate alınarak)	İyileşene kadar beklenir	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hayvan ısırıkları: kuduz aşısı uygulaması	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hayvan ısırıkları: kuduz immünglobülin kullanımı	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hematüri	Tanı konana kadar ertelenir. Daha sonra tanıya göre karar verilir.	Geçici Ret	Ürolojik Durum ve Hastalıklar	Tetkik ve İncelemeler
Hemofili	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Koagülasyon Faktör Eksiklikleri
Hemoglobin düzeyinin düşük olması	Nedene göre süre verilmelidir. Tam kan bağıışı asgari hemoglobin düzeyleri kadınlarda 12,5 g/dl, erkeklerde 13,5 g/dl'dir. Çift eritrosit aferezi için hemoglobin düzeyi en az 14 g/dl olmalıdır.	Geçici Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Majör Hematolojik Semptomlar
Hemoglobin düzeyinin yüksek olması	Nedene göre süre verilmelidir	Geçici Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Majör Hematolojik Semptomlar
Hepatit A	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Hepatit B öyküsü	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Hepatit B taşıyıcıları	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Hepatit C öyküsü	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Hepatit C taşıyıcıları	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Hepatit: nedeni bilinmeyen/belirlenemeyen	Enfeksiyon hastalıkları polikliniği olan bir hastaneden alınmış test raporları ile belgelemesi talep edilir. Kan bağıışı için hepatit öyküsü üzerinden en az 24 ay geçmiş olmalı ve hbsag, antihbc ve antihcv negatif olmalıdır.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Herpes	Oral/genital lezyonları tamamen iyileştikten sonra en az 1 hafta	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
HIV I-II taşıyıcılığı	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
HIV yönünden riskli bölgelerde 1977 yılından sonra doğmuş kişiler	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
HIV yönünden riskli bölgelerde 6 aydan kısa yaşamış ancak bu süre içinde kan/kan ürünü almış kişiler	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
HIV yönünden riskli bölgelerde 6 aydan uzun süre yaşamış kişiler	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Hiperparatroidizm	Asemptomatik olana kadar ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Paratroid Hastalıkları
Hipertroidizm	Tiroid fonksiyonları normale, kabul edilir	Geçici Ret	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Troid Hastalıkları
Hipoglisemi öyküsü	Asemptomatik olana kadar ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Karbohidrat Metabolizması Hastalıkları
Hipoparatroidizm	Asemptomatik olana kadar ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Paratroid Hastalıkları
Hipotroidizm	Troid fonksiyonları normale, kabul edilir	Geçici Ret	Endokrin Sistem ve Metabolik Hastalıklar	Troid Hastalıkları
HTLV I-II	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
İmmüntrombositopenik purpura	Tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben en az 5 yıl	Geçici Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Trombosit Hastalıkları
İdrar yolu enfeksiyonları	Tekrarlamayan idrar yolu enfeksiyonlarında tedavi sonrası böbrek fonksiyonları normalleşene kadar ve semptomsuz olana kadar ret	Geçici Ret: Şartlı	Nefrolojik Hastalıklar	Enfeksiyon Hastalıkları
İlaç bağımlılığı veya şüphesi (im/iv kullanılan yasa dışı uyuşturucular)	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Bağımlılığı
İlaç suistimali veya şüphesi (im/iv kullanılan vücut geliştiriciler ve steroidler)	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Suistimali
İlaçlar: antibiyotik kullanımı	Genel olarak son dozdan sonra en az 48 saat ertelenmelidir. Cinsel yolla bulaşan bir hastalığın tedavisi için kullanılmışsa, 12 ay ertelenir.	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Aspirin: asetil salisilik asit	Aferez trombosit süspansiyonu hazırlanacaksa 5 gün. Tam kan bağışına engel değildir. Sadece, tam kandan trombosit elde edilmez.	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Digoxin, Digoksin	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Dutasterid	Son dozun kullanımını takiben en az 6 ay reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Etreinat	Son dozun kullanımını takiben en az 3 yıl reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Finasterid	Son dozun kullanımını takiben en az 1 ay reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: hayvan kaynaklı insulin	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: insan kaynaklı	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
<i>Ret Nedeni</i>	<i>Ret Süresi ve Bilgi</i>	<i>Ret Tipi</i>	<i>Ana Kategori</i>	<i>Alt Kategori</i>
immunglobulinler				
İlaçlar: insan kaynaklı pıhtılaşma etkenleri	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: İsoetretinoin	Son dozun kullanımını takiben en az 1 ay reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: kadavra kaynaklı growth hormon	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Kortikosteroidler	Son 12 ay içinde 6 ay veya daha uzun süre oral, i.v. veya i.m. kullanımda tam iyileşmeyi takiben, son dozdan en az 12 ay ertelenir	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Kortikosteroidler	Son 12 ay içinde 6 aydan kısa süreli oral, i.v. veya i.m. kullanımda tam iyileşmeyi takiben, son dozdan en az 7 gün ertelenir	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Kortikosteroidler	İlaç kullanım nedeni öncelikle değerlendirilmelidir. Sadece topikal uygulamada, flebotomi alanına uygulanmıyorsa engel değildir.	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Metimazol	İlacın kullanımı süresince reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: NSAİ ilaçlar (aspirin ve piroksikam hariç)	Aferez trombosit süspansiyonu hazırlanacaksa 48 saat. Tam kan bağışına engel değildir. Sadece, tam kandan trombosit elde edilmez.	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Piroksikam	Aferez trombosit süspansiyonu hazırlanacaksa 5 gün. Tam kan bağışına engel değildir. Sadece, tam kandan trombosit elde edilmez.	Geçici Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlaçlar: Tamoksifen (tamoksifen sitrat)	Sürekli	Kalıcı Ret	İlaçlar	İlaç Kullanımı

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
İlaçlar: Tretinoin	Sistemik kullanımda son dozun kullanımını takiben en az 1 ay reddedilir. Topikal kullanım kan bağışına engel değildir.	Geçici Ret: Şartlı	İlaçlar	İlaç Kullanımı
İlk bağış	Bağışçı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Tek başına ret nedeni değildir.	Geçici Ret	Bağışçı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski
İnsan ısırgığı	12 Ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
İnsan kaynaklı doku veya hücre nakli	12 Ay	Geçici Ret	Transplantasyon	Transplantasyon
Kabakulak: çocukluk çağı viral enfeksiyonlar	Etkenle karşılaştıktan sonra en az 21 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Kan transfüzyonu (otolog transfüzyon hariç)	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Kardiyomyopati	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Myokard Hastalıkları
Kemik iliği bağışçısı	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Kendine zarar verenler: jilet atma gibi	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Kendini iyi ve sağlıklı hissetmemesi	1 gün	Geçici Ret	Temel Kriterler	Genel Durum
Kendini ret: bulaş riski	12 ay	Geçici Ret	Bağışçının Kendini Reddi	Enfeksiyon Hastalıkları
Kendini ret: bulaş riski	Sürekli	Kalıcı Ret	Bağışçının Kendini Reddi	Enfeksiyon Hastalıkları
Kendini ret: diğer nedenler	Sürekli	Kalıcı Ret	Bağışçının Kendini Reddi	Diğer Nedenler
Kendini ret: diğer nedenler	Nedene göre karar verilir	Geçici Ret	Bağışçının Kendini Reddi	Diğer Nedenler
Kızamık: çocukluk çağı viral enfeksiyonlar	Etkenle karşılaştıktan sonra en az 21 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Kızamıkçık: çocukluk çağı viral enfeksiyonlar	Etkenle karşılaştıktan sonra en az 21 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Kızıl	Semptomların bitiminden en az 3 gün sonra	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Kimlik belgesi bulunmaması	Geçerli kimlik belgesi sunana kadar reddedilir.	Geçici Ret: Şartlı	Temel Kriterler	İdari Nedenler

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Kistik fibrozis	Enfeksiyonsuz ve asemptomatik olana kadar ertelenir	Geçici Ret: Şartlı	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları
Klinik deneyler	Herhangi bir ilaç kullanımı söz konusu ise, 12 ay ertelenir	Geçici Ret	Klinik Deneyler	Klinik Deneyler
Kokain kullanımı	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Kooperasyon: akıl sağlığı yönünden yasal ehliyetin olmaması	Sürekli	Kalıcı Ret	Psikososyal Durumlar	Kooperasyon Problemleri
Kooperasyon: sorgulamada mental yönden tam kooperasyon sağlanmasını engelleyecek kronik bir hastalığın varlığı	Sürekli	Kalıcı Ret	Psikososyal Durumlar	Kooperasyon Problemleri
Kornea nakli	Sürekli	Kalıcı Ret	Transplantasyon	Transplantasyon
Koroner tromboz	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Koroner Arter Hastalıkları
Kozmetik maksatlı uygulamalar: botoks, yağ, silikon gibi uygulamalar	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Kronik böbrek yetmezliği	Sürekli	Kalıcı Ret	Nefrolojik Hastalıklar	Renal Yetmezlikler
Kronik kalp yetmezliği	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Myokard Hastalıkları
Kronik karaciğer yetmezliği	Sürekli	Kalıcı Ret	Hepatobilier Sistem Hastalıkları	Karaciğerin Kronik Hastalıkları
Kronik nefrit	Sürekli	Kalıcı Ret	Nefrolojik Hastalıklar	Kronik Böbrek Hastalıkları
Kusma	Herhangi bir hastalığın göstergesi değilse, 1 gün.	Geçici Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Majör GIS Semptomları
Kusma	Diare ile birlikte ise, tam iyileşme ve semptomların bitimini takiben en az 3 gün beklenir	Geçici Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Majör GIS Semptomları

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
<i>Ret Nedeni</i>	<i>Ret Süresi ve Bilgi</i>	<i>Ret Tipi</i>	<i>Ana Kategori</i>	<i>Alt Kategori</i>
Leishmaniasis (Kala-azar, Kara Humma)	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyonlar
Lökosit sayısının yüksek olması	Nedene göre süre verilmelidir	Geçici Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Majör Hematolojik Semptomlar
Malarya: endemik olduğu bölgede süreklilik arz edecek şekilde 6 ay veya daha uzun süre bulunmuş kişiler	Endemik bölgeden döndükten en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağıışı yapabilirler.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: endemik olduğu bölgede süreklilik arz edecek şekilde 6 ay veya daha uzun süre bulunmuş kişiler	Eğer test yapılmamışsa, yapılan ve "negatif" sonuç çıkana kadar reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: endemik olduğu bölgede süreklilik arz edecek şekilde 6 ay veya daha uzun süre bulunmuş kişiler	Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malarya öyküsü veren kişiler	Tedavi tamamlanana ve hiç bir semptom kalmayana kadar reddedilir. Bu kişiler, tam iyileşmeyi takiben en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağıışı yapabilirler	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malarya öyküsü veren kişiler	Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malaryanın endemik olduğu bir bölgeden döndükten sonraki 6 aylık süreç içerisinde malarya ile uyumlu ve henüz tanı konmamış ateşli tablo öyküsü olan kişiler	Tam iyileşmeyi takiben en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikor testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağıışı yapabilirler.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Malarya: malaryanın endemik olduğu bir bölgeden döndükten sonraki 6 aylık süreç içerisinde malarya ile uyumlu ve henüz tanı konmamış ateşli tablo öyküsü olan kişiler	Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malaryanın endemik olduğu bir bölgeden döndükten sonraki 6 aylık süreç içerisinde malarya ile uyumlu ve henüz tanı konmamış ateşli tablo öyküsü olan kişiler	Eğer test yapılmamışsa, yapılan ve "negatif" sonuç çıkana kadar reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malaryanın endemik olduğu bir bölgeyi ziyaret etmiş ancak herhangi bir klinik semptomu bulunmayan kişiler	Endemik bölgeden döndükten en az 4 ay sonra malarya için valide edilmiş bir antikör testi sonucu "negatif" olması halinde kan bağıışı yapabilirler.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malaryanın endemik olduğu bir bölgeyi ziyaret etmiş ancak herhangi bir klinik semptomu bulunmayan kişiler	Eğer test yapılmamışsa, endemik bölgeden son dönüşünden itibaren 12 ay boyunca reddedilir.	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Malarya: malaryanın endemik olduğu bir bölgeyi ziyaret etmiş ancak herhangi bir klinik semptomu bulunmayan kişiler	Eğer test sonucu tekrarlayan pozitiflik gösteriyorsa, 3 yıl boyunca reddedilir ve test sonucunun negatifleşmesi beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyon Riski
Maliniteöyküsü	Sürekli	Kalıcı Ret	Onkolojik Hastalıklar	Onkolojik Hastalıklar
Marfan sendromu (kalp ve damar tutulumu varsa)	Sürekli	Kalıcı Ret	Kas İskelet Sistemi ve Bağ Doku Hastalıkları	Konjenital Bağ Doku Hastalıkları
Meniere hastalığı	Asemptomatik olana kadar reddedilir	Geçici Ret: Şartlı	Kulak Burun Boğaz Hastalıkları	İç Kulak Hastalıkları

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Menstruasyon	Tek başına engel değildir	Geçici Ret	Jinekoloji ve Obstetrik	Fizyolojik Durumlar
Multiple skleroz	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Demyelinizan Hastalıklar
Myasthenia gravis	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Periferik Sinir Sistemi Hastalıkları
Myokard enfarktüsü öyküsü	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Koroner Arter Hastalıkları
Nabız: düzensiz nabız (ritm bozukluğu, aritmi, disritmi)	Nedene göre süre verilmelidir	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar
Nabız: nabızın dakikada 100'den fazla olması (yüksek nabız)	1 gün	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar
Nabız: nabızın dakikada 50'den az olması (düşük nabız)	1 gün	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Majör Kardiyovasküler Semptomlar
Narkolepsi	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Uyku Hastalıkları
Orak hücre anemisi	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Orak hücre anemisi taşıyıcılığı	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Osteomyelit	Tam iyileşmeden ve tedavinin tamamlanmasından sonra en az 2 yıl	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyel Bulaş
Otoimmün hastalık: organ tutulumu olan kişiler	Sürekli	Kalıcı Ret	Otoimmün Hastalıklar	Otoimmün Hastalıklar
Otolog kan bağıışı için ret nedenidir.	Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyel Enfeksiyon
Over Kisti	Kendini iyi hissediyorsa ve doktor takibinde değilse kan bağıışı yapabilir	Geçici Ret	Jinekoloji ve Obstetrik	Over Hastalıkları
Paraziter hastalıklar: ayrıca bakınız kalıcı ret nedenleri	Tam iyileşme sağlanana ve tedavi bitene kadar	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyonlar

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Piruvat kinaz eksikliği	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Polikistik böbrek hastalığı	Tek başına bağışa engel değildir. Bağışçının sağlığı değerlendirilmeli ve ona göre karar verilmelidir.	Geçici Ret	Nefrolojik Hastalıklar	Konjenital Kistik Hastalıklar
Polisitemia vera	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Prostat hiperplazisi, benign	Dutasterid grubu ilaç kullanımı varsa, son dozdan sonra 6 ay	Geçici Ret: Şartlı	Ürolojik Durum ve Hastalıklar	Prostat Hastalıkları
Prostat hiperplazisi, benign	Finasterid grubu ilaç kullanımı varsa, son dozdan sonra 1 ay	Geçici Ret: Şartlı	Ürolojik Durum ve Hastalıklar	Prostat Hastalıkları
Q Ateşi	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Ritm bozukluğu: ağır kardiyak aritmi öyküsü veya tedavi gerektiren aritmi	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Ritm Bozuklukları
Akut romatizmal ateş	Kronik kalp hastalığı veya başka bir komplikasyon gelişmemişse tam iyileşmeyi takiben 2 yıl	Geçici Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Kalp Kapak Hastalıkları
Saç ekimi	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Sağlık personeli: hastaların vücut salgıları ile doğrudan inokülasyon yada müköz membran teması olması	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Sağlık personeli: Hepatit B enfeksiyonu olan biriyle işi gereği sürekli temasta olan sağlık personeli	Aşı ile bağışıklanmış olduğunu kanıtlamalıdır. Enfeksiyon hastalıkları polikliniği olan bir hastaneden alınmış test raporları (Anti-HBc negatif, Anti-HBs pozitif) ile belgelemesi talep edilir.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Sağlık personeli: Hepatit C enfeksiyonu olan biriyle işi gereği sürekli temasta olan sağlık personeli	Risk içeren hasta grubu ile son temastan itibaren en az 12 ay geçmiş olmalıdır.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
<i>Ret Nedeni</i>	<i>Ret Süresi ve Bilgi</i>	<i>Ret Tipi</i>	<i>Ana Kategori</i>	<i>Alt Kategori</i>
Sarkoidoz	Sürekli	Kalıcı Ret	Göğüs Hastalıkları	Göğüs Hastalıkları
Seks işçileri	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Serebrovasküler hastalık öyküsü	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Serebral Damar Hastalıkları
Sferositoz	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Sifiliz	Sürekli	Kalıcı Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Siğiller	Flebotomi sahasında ise, tam iyileşme sağlanana kadar beklenir	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Siroz	Sürekli	Kalıcı Ret	Hepatobilier Sistem Hastalıkları	Karaciğerin Kronik Hastalıkları
Soğuk algınlığı	Ateş yoksa tam iyileşmeyi takiben en az 3 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Splenektomi: bir hastalığın tedavisi için uygulanmış olan splenektomi	Sürekli	Kalıcı Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Cerrahi Uygulamalar
Stent takılmış olması	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Koroner Arter Hastalıkları
Stroke (İnme)	Sürekli	Kalıcı Ret	Nörolojik Hastalıklar	Serebral Damar Hastalıkları
Su çiçeği: çocukluk çağı viral enfeksiyonlar	Etkenle karşılandıktan sonra en az 21 gün	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Hastalıklar
Temporal arterit	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Talasemi major	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Talasemi taşıyıcılığı	Sağlık durumu iyi ise ve hemoglobin düzeyi normale, kan bağıışı yapabilir	Geçici Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Eritrosit Hastalıkları
Toksoplazma	Tam iyileşmeden ve tedavinin tamamlanmasından sonra en az 6 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Paraziter Enfeksiyonlar

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Trombositoz	Trombosit sayısı $450 \times 10^9/L$ üzerinde ise altta yatan neden belli olana ve trombosit sayısı $450 \times 10^9/L$ altına düşene kadar kan bağıışı kabul edilmez.	Geçici Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Trombosit Hastalıkları
Tüberküloz	Tam iyileşmeden ve tedavinin tamamlanmasından sonra en az 2 yıl	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Bakteriyal Bulaş
Uykusuz olmak	Bağıışı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Bağıışı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski
Uyuşturucu kullanıldığına (i.m./i.v. yasadışı) dair kuvvetli bilgi/şüphe	Sürekli	Kalıcı Ret	Psikososyal Durumlar	Madde Bağıımlılığı
Ülseratif kolit	Sürekli	Kalıcı Ret	Gastrointestinal Sistem Hastalıkları	Kronik İnflamatuar Hastalıklar
Venöz tromboz (tekrarlayan)	Sürekli	Kalıcı Ret	Kardiyovasküler Sistem Hastalıkları	Damar Hastalıkları
Von Willebrand hastalığı	Sürekli	Kalıcı Ret	Hematolojik Durum ve Hastalıklar	Koagülasyon Faktör Eksiklikleri
Vücut ağırlığı: çift eritrosit aferezi için vücut ağırlığının 70 kg'dan az olması	1 ay	Geçici Ret	Temel Kriterler	Vücut Ağırlığı
Vücut ağırlığı: vücut ağırlığının 50 kg'dan az olması	1 ay	Geçici Ret	Temel Kriterler	Vücut Ağırlığı
Vücut ağırlığının düşük olması	Bağıışı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Bağıışı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski
Vücut ısısı: 37,5 santigrad dereceden yüksek olması	Nedene göre süre verilmelidir	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Majör Enfeksiyon Semptomları
Xenotransplant alıcıları	Sürekli	Kalıcı Ret	Transplantasyon	Transplantasyon

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ FORMU

KAN BAĞIŞÇISI RET KRİTERLERİ				
Ret Nedeni	Ret Süresi ve Bilgi	Ret Tipi	Ana Kategori	Alt Kategori
Yakın ilişki: Hepatit B enfeksiyonu olan kişinin cinsel partneri veya yakın temasındaki kimseler	Aşı ile bağışıklanmış olduğunu kanıtlamalıdır. Enfeksiyon hastalıkları polikliniği olan bir hastaneden alınmış test raporları (Anti-HBc negatif, Anti-HBs pozitif) ile belgelemesi talep edilir.	Geçici Ret: Şartlı	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Yakın ilişki: Hepatit C enfeksiyonu olan kişinin cinsel partneri veya yakın temasındaki kimseler	Son temastan sonra en az 12 ay geçmiş olmalıdır.	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Yakın ilişki: nedeni bilinmeyen/belirlenemeyen hepatit enfeksiyonu olan kişinin cinsel partneri veya aynı evi paylaşan kimseler	12 ay	Geçici Ret	Enfeksiyon Hastalıkları	Viral Bulaş Riski
Yaş: 18 yaşının dolmamış olması	18 yaşın dolmasına kadar	Geçici Ret	Temel Kriterler	Yaş Aralığı
Yaş: 61 yaşından gün almış kişinin ilk kez kan bağış yapma talebi	Sürekli	Kalıcı Ret	Temel Kriterler	Yaş Aralığı
Yaş: 65 yaş üstü düzenli bağışçının yılda 1 kezden sık bağış talebi	Son bağıştan sonra en az 12 ay	Geçici Ret	Temel Kriterler	Yaş Aralığı
Yaş: 66 yaşından gün almış düzenli olmayan bağışçı	Sürekli	Kalıcı Ret	Temel Kriterler	Yaş Aralığı
Yaş: 70 yaşından gün almış düzenli bağışçı	Sürekli	Kalıcı Ret	Temel Kriterler	Yaş Aralığı
Yaş: düşük yaş (20 yaş ve altındakiler)	Bağışçı reaksiyonu şüphesi durumunda risk faktörlerinden biri olarak değerlendirilebilir. Uygun süre reddedilir.	Geçici Ret	Bağışçı Reaksiyon Riski	Vazovagal Reaksiyon Riski